

BOTANISCHES INSTITUT  
der k. k. Universität.

J. No

B

8202/4

DEUTSCHLANDS SCHWAMME

6te Lieferung.



8202/4

BOTANISCHES MUSEUM  
der k. k. Universität.

J.N.º 2932

B

~~73/4577x~~  
C204/4

# Deutschlands Schwämme

getrockneten Exemplaren.

Fortgesetzt gesammelt und herausgegeben

von

J. C. Schmidt und G. Kunze.



*Sechste Lieferung.*

Nr. CXXVI—CL.

---

Leipzig, 1817.  
G. Vofs'sche Buchhandlung.

\*CXXVI. *Sphaeria cohaerens*: gregaria confluens planiuscula, primo laevis sordide fuscescens, demum subbullata nigrescens. Pers. Syn. fung. p. 11.

In cortice ligni faginei caesi, vernalis.

\*CXXVII. *Sphaeria rubra*: epiphylla orbicularis rubra, margine glabro, ostiolis subimmersis obscurioribus. E. Fries. Observ. myc. p. 172. Xyloma rubrum Pers. Syn. fung. p. 105. Polystigma Pers. in de Cand. Fl. Gall. Suppl. p. 164. Sph. hyetospilus Martius Fl. Crypt. Erlang. p. 478. (ad partem) superiorem foliorum Pruni spinosae et domesticae paginam incolit aestate et autumnno.

\*CXXVIII. *Sphaeria lata*: late effusa subrugoso-opaca, sphaerulis subprominulis intus albidis, ostiolis conicis asperis Pers. Syn. fung. p. 29.

β. *glebulosa* Pers. in litt: stromate pulveraceo, nigro.

Lipsiae ad ramos exsiccatos vere lecta.

CXXIX. *Sphaeria Anethi*: elongata interrupta sublinearis rugosa opaca, sphaerulis cohaerentibus papillatis subnudis. Pers. Syn. fung. p. 50.

In caulibus plantarum umbelliferarum Franconiae lectam amice largitus est. cl. Funck.

\*CXXX. *Sphaeria salicina*: circinnata ostiolis apice in discum rugosum subperforatum concretis. Pers. Syn. fung. p. 47.

Habitat ad ramos salicinos omni anni tempore.

\*CXXXI. *Sphaeria dryina*: imposita, sociata, globosa, atra, ostiolo octuplo longiori, setaceo tenuissimo. Nees ab Esenb. System der Pilze und Schwaemme p. 84. Tab. XLIII. f. 354. Pers. Syn. fung. p. 58.

Habitat ad ligna.

Obs: Valde similes species: *S. pinastri* Nees ab Es. et pilifera Fries in Vetesk. Ac. Handl.

\*CXXXII. *Sphaeria setacea*: simplex epiphylla, sphaerulis sparsis in folii substantia latentibus, ostioliis prominulis setaceis attenuatis. Pers. Syn. fung. p. 62.

In foliis quercinis delapsis hieme et vere.

CXXXIII. *Sphaeria pityophila* Nobis (simplex, brachystoma): conferta, atra, hypothallo crustaeformi, tenui, concolori imposita, peritheciis primo globosis, papillatis, dein pertusis, demum collabescendo concavis.

Ad corticem truncorum et ramorum adhuc vigentium Pini sylvestris in Lusatia. Vernalis.

Obs: Hypothallus interdum, licet rarissime, fere deest.

\*CXXXIV. *Hysterium contortum*: confertum nigrum, peritheciis subcompressis flexuosis connatis subrugosis, labiis subprominentibus (clausis), thecis subcylindricis, spondiis globosis. Ditmar in Sturmii: Deutschlands Flora IIIte Abthlg. Die Pilze. Heft. 2. p. 65. Tab. 52.

In cortice Pini sylvestris prope Zittau in Lusatia. Nonnunquam in consortio cum *Racodio* vulgari Fries. Aestate lectum.

\*CXXXV. *Hysterium pinastri*: erumpens ovale planum nigrum nitidum saepe lineis nigris limitatum. Schrader bot. Journal II. p. 69. tab. 3. F. 4. Pers. Syn. fung. in addendis p. XXVIII. Hypoderma De Lam. et de Cand. Syn. Fl. Gall. p. 64.

In acubus dejectis Pini sylvestris, aestate.

\*CXXXVI. *Coryneum pulvinatum*: caespitibus subrotundis, pulvinatis; sporidiis oblongis, obtusis; pedicellis cylindricis. Kunze Mykologische Hefte I. p. 78. Tab. II. f. 19.

In ramulis semivivis Ulmi, Carpini, Salicum aliarumque arborum; vere lectam.

- \*CXXXVII. *Sclerotium inclusum*: sparsum, foliis perforando-immersum. lenticulare, rugosum, primo spadiceum, demum nigrum.

*Sclerotium inclusum* Persoon in litt.

Habitat in utraque pagina foliorum populinorum semiputridorum, hieme.

- \*CXXXVIII. *Exosporium Rubi*: epiphyllum nigrum; stromate hemisphaerico-depresso punctiformi, area fusca circumdato, sporidiis distantibus. *Nees ab Esenbeck* in litt.

Folia Rubi caesii L. Lipsiensis, incolit autumnno et hieme.

Obs: Mox fusius describendum ab auctore in actis Acad. Car. Leop. Nat. Cur.

- \*CXXXIX. *Peridermium Pini*: simplex, sparsum exsertum, peridio pallido oblongo compresso, pulvere aurantiaco copiosissimo. Hypoderma, *Peridermium* Link Obs. in ord. pl. nat. II. p. 29. *Caecoma Pini* Nees ab Esenbeck, system p. 13. Tab. I f. 4. *Aecid Pini* Pers. Syn. p. 213.

α, corticola.

In ramulis Pini sylvestris Lusatae superioris aestate.

- CXL. *Peridermium columnare*: simplex tenue nudum cylindrico elongatum apice lacerum album pulvere aurantiaco. Link l. c. Alb. et Schw. Consp. fung. p. 121. Tab. V. f. 4.

In acubus Pini piceae cum praecedente.

- CXLI. *Peridermium elatinum*: simplex immersum, peridiis ellipticis laceris pallidis, pulvere aureo. Link l. c. *Aecidium elatinum* Alb. et Schw. l. c. p. 121. Tab. V. f. 3.

In Pino picea Lusatae aestate.

- \*CXLII. *Aecidium rubellum*: hypophyllum fronde supra rubro-macula-

ta, peridiis minimis confluentibus subimmersis, pallide flavis, pulvere albo flavescente. De Lamark et de Candolle Synops. Flor. Gall. p. 50.

$\alpha$ , *rumicis*, *Aecidium Rumicis* Pers. l. c. p. 207.

In foliis Rumicum, aestate pluvia.

\*CXLIII. *Uredo* (Caeoma U.) *epitea*: acervulis hypophyllis rotundis sparsis, primo fulvis, demum pallescentibus, indusio cinctis, sporangiolis subrotundis et pyriformibus. Kunze l. c. l. p. 68.

Occupat folia Salicis viminalis, aestate.

\*CXLIV. *Uredo* (Caeoma U.) *tremellosa*: immatura clausa pustulaeformis subtremellosa, matura dehiscens pulverulenta flavescens.

$\beta$ , *ringentium*: inaequalis subsparsa aurantia v. Strufs. Wetterauer Annalen II. 1. p. 90.

$\alpha\alpha$ , *Euphrasiae*, *Uredo Euphrasiae* Rebent. Fl. Neom. no. 12. 13.

Habitat Euphrasiam officinalem, odontitem, nemorosam P. luteam.

\*CXLV. *Uredo* (Caeoma U.) *scutellata*: caespitulis fusco-umbrinis hypophyllis saepius ad margines folii seriatis orbiculatis planiusculis epidermide rupta junctis, capsulis subglobosis. De Lam. et de Cand. l. c. p. 47. Pers. l. l. p. 220.

Frequens in Euphorbia cyparissia, aestate.

\*CXLVI. *Uredo* (Caeoma U.) *Ficariae*: e badio nigrescens subbullata, caespitulis majusculis solitariis parcis subrotundis, sporulis rotundo-ovatis subcaudatis. Alb. et Schw. l. c. p. 128.

Habitat folia et petiolos Ficariae verna, vere.

\*CXLVII. *Puccinia* (Caeoma, Dicaeoma) *Valantiae*: sparsa nigrescente-spadicea, sporulis fusiformibus. Pers. l. c. p. 227.

Occurrit in foliis et caulibus Valantiae cruciatae aestivalis.

CXLVIII, *Puccinia*, (*Caeoma Dicaeoma*) *asarina*: macula circumscripta; acervulis amphigenis et epimischis, solitariis, haemisphaericis e fusco badiis, indusio demum evanescente, in acervos subrotundos vel oblongos aggregatis, sporidiis ovato-oblongis, pedunculo recto brevissimo. Kunze l. c. p. 70.

In Asaro Europaeo invenitur aestate et autumnno.

\*CXLIX. *Tremella spiculosa*: applanata effusa crassiuscula nigra, papillis conicis spiculosa. Pers. l. l. p. 624.

Pineos truncos obtegens vere lecta.

\*CL. *Peziza abietis*: cespitosa rugosa opaca sordide nigra rotunda aut subcompressa, oris inflexis. Pers. l. c. p. 671.

Ad ramos abietinos aestate lecta.





