

BOTANISCHES INSTITUT
der k. k. Universität.

J. No.

B

Chork/4

DEUTSCHLANDS SCHWÄMME

9.^{te} Lieferung.



BOTANISCHES MUSEUM
der k. k. Universität.

J. N° 2932

B

~~293 / 45xx~~
C 202/4

Deutschlands Schwämme in getrockneten Exemplaren.

Fortgesetzt gesammelt und herausgegeben

von

J. C. Schmidt und G. Kunze.



Neunte Lieferung.

Nr. CCI. — CCXXV.



Leipzig, 1819.

Bei Leopold Voss.

*CC_I. *Sphaeria flavovirens*: composita, substantia pulverulenta, flavovirescente. Persoon Syn. Fung. p. 22.

Incolit ramos exsiccatos duriores. Specimina lecta hieme.

Obs: Modo subrotundata, modo magis effusa occurrit.

CC_{II}. *Sphaeria rimosa*: linearis-oblonga, per rimas parallelas erumpens, stromate nigro pulverulento, sphaerulis latentibus congestis parallele seriatis albido-farctis.

β atra. De Albertini et Schweinitz Consp. fung. agri Nieskyensis p. 13.

Obvenit vernalis in Pteridis aquilinae stipitibus. Specimina benevole communicavit dilectissimus Dr. Ehrenberg.

Obs: Aegre a Leptostomate Pteridis Fries dignoscitur.

*CC_{III}. *Sphaeria scabra*: stromate ambiente, effuso, suberoso, opaco, nigro, sub epidermide occulto, peritheciis globosis per ramorum epidermidem erumpentibus, primo astomis, demum pertusis. Schmidt Myk. Hefte. I. p. 58.

Habitat Lipsiae in ramis Robiniae Pseudacaciae exsiccatis. Vere lecta.

Obs: Asci cylindrici, serius evanescentes, thecae aperte trisep-tatae. Similis S. elongatae Fries Obs. myc. I. p. 175.

CC_{IV}. *Sphaeria bifrons Nobis*: epiphylla, orbiculatim disposita: stromate applanato, tenui, maculaeformi, atronitente; peritheciis hemisphaericis, prominulis, primo astomis, dein pertusis. Xyloma bifrons De Lamarck et de Candolle Fl. Fr. V. p. 156. De Cand. Mém. sur le Genre Xyloma, conf. Mém. du Mus. Ann. II. Cah. 2. p. 322 cum icon. Xyloma circinans Pers. in litt. in Maugeot et Nestler Stirp. Crypt. Voges. Rhen. Fasc. V. no. 480.

In superiore parte foliorum Quercus pedunculatae dejectorum hieme in monte Ettersberg prope Vinarium lecta.

Obs: Asci claviformes, thecis ovalibus 4—5 referti. — Secundum definitionem non minus hujus loci videtur Depazea querina Fries obs. myc. II. p. 365.

CCV. *Sphaeria Ostruthii*: epiphylla minuta difformis, sphaerulis crusta*e* cinerascenti immersis subconfluentibus. E. Fries obs. myc. I. p. 174.

Habitat autumnalis in inferiore latere foliorum Imperatoriae Ostruthium. Lecta prope oppidum Saxoniae metalliferae: Johann-Georgenstadt et nobiscum communicata ab amiciss. Radio, Med. Bacc. Lipsiensi.

CCVI. *Sphaeria chionea*: sphaerulis superficialibus globosis rugulosopubescentibus albis, ostiolo subulato, stricto, subflavescente. Ceratostoma chioneum E. Fries obs. myc. II. p. 340. cum iconē S. chionea Ehrenberg Sylv. mycol. Berolin. p. 29.

In foliis pineis putridis lectam dedit conjunctissimus Dr. Ehrenberg.

Obs: Sphaerulae revera villo albido obductae sunt; sed admodum fugaci. Remoto eo flavidae conspicuntur. Ceterum specimena nostra cum illis, quae ex amica Cl. Friesii manu acceperimus, plane congruunt.

CCVII. *Sphaeria Dianthi*: sphaerulis nigris, disco collapsis pallidis, maculae luteae crustaeformi sparsim insidentibus. De Albert. et Schwein, consp. fung. agri Niesk. p. 47.

β *Saponariae Nobis*: Mykol. Hefte I. p. 107. *Sphaeria Saponariae* de Cand. Fl. Fr. Suppl. p. 146. *Nemaspora epiphylla* eiusdem Syn. Fl. Gall. p. 63.

Incolit folia Saponariae officinalis Vinariae, ad Ilmam rivulum autumno.

*CCVIII. *Melanconium betulinum Nobis*: stromate compresso-conico, basi late effuso, sulphureo, sub epidermide occulto; sporidiis informam subconicam, irregularem coacervatis, conglutinatis, atris, uniseptatis.

In cortice Betulae albae lectam benigne dedit Cl. Dr. Ehrenberg.

Obs: Insignis species, alio loco fusius describenda.

*CCIX. *Hysterium pithyrum Nobis*: pygmaeum, simplex, gregarium, superficiale, obconico-cylindricum, nigrum: labiis rotundo-ovatis, longitudinaliter striatis.

Incolit innumeris gregibus cortices Pini abietis exsicatos et delapsos. Prope Lipsiam legimus mense Julio.

Obs: Refert quodammodo habitu Sphaeriam platystomam (Lophium Fr.) sive Hysterium pedicellatum Schum. imminutum. Ascis, aegre ceterum observandos, vidimus cylindricos; sed tantum thecis vacuos. Thecae vero probabiliter sphaericae certe hujus generis corpuscula secus ascis invenimus.

*CCX. *Aecidium Allii ursini*: subcespitosum flavescens, periidis in circulum digestis. Pers. Syn. Fung. p. 210.

In Allii ursini foliis Lipsiae legimus Majo mense.

*CCXI. *Aecidium Sii Falcariae*: simplex subconfertum flavum, periidi dentibus latiusculis suberectis. Pers. I. l. p. 212.

Occurrit in foliis Sii Falcariae in agris Vinariensis aestivali.

*CCXII. *Uredo Tussilaginis*: punctis subconcentricis miniato-rubris. Pers. I. l. p. 218. U. circinalis ε de Strauss Wetter. Ann. II. 1. p. 89.

Habitat in foliis Tussilaginis Farfarae prope Lipsiam autumno.

*CCXIII. *Uredo pustulata*: subrotunda flavescens minuta prominula clausa, in glomerulos collecta.

α *Epilobii* Pers. I. l. p. 219.

In foliis Epilobii rosei Willd. Lipsiae aestate lecta.

*CCXIV. *Uredo cylindrica*: conferta flavescens inaequalis bullata, ut plurimum clausa, capsulis oblongis cylindricis de Strauss I. c. p. 92. no. 9. U. populina α Pers. Syn. Fung. p. 219. De Alb. et Schwein. Consp. fung. p. 125. no. 553 α (ad partem).

Lecta in foliis Populi balsamiferae ad acidulam Franconiae Alexandersbad. Augusto.

Obs: U. populina Pers. et Alb. et Schw. duas amplectitur species, easque diversissimas, quas nobilissimus Straussius in U. cylindrica et ovatam rite se junxit. U. longicapsula(!) et populina auctorum Fl. Gall. maximam partem ad U. ovatam pertinere videntur. U. cylindrica, quantum quidem nobis innotuit, sedem suam (Populum balsamiferam) nunquam dereliquit.

*CCXV. *Uredo Geranii*: cespitulis fuscis hypophyllis orbicularibus epidermide erupta cinctis, tandem, pulvere diffuso subirregularibus capsulis (globosis Synops. Fl. Gall.) ovatis breviter pedunculatis (Fl. Fr. Suppl.) D. Lam. et de Cand. Syn. Fl. Gall. p. 47. et hujus Fl. Fr. Suppl. p. 73.

Lipsiae in foliis Geranii palustris Junio, Julioque mensibus.

Obs: Infestat varias Geranii species. Candollius in G. aconitifolio, molli et nodoso observavit.

CCXVI. *Uredo Cytisi:* conferta inaequalis badia; capsulis minutissimis globosis mucronulatis.

β *Cytisi nigricantis* de Strauss Wett. Ann. II. 1. p. 98.

Ut plurimum hypophylla, rarius epiphylla occurrit loco suo, Augusto et Septembri. Specimina lecta sunt in Saxoniae ditione Neustadiensi prope Ziegenrück.

Obs: Forma sporidiorum minus constanter sphaerica, quam l. l. depingitur; interdum in ovatam vergit. U. Cytisi Cand. Fl. Fr. Suppl. p. 63. in C. sessilifolio lecta, secundum descriptionem a nostra differt.

***CCXVII.** *Uredo Ornithogali Nobis:* cespitulis amphigenis, magnis, subsolitariis, oblongis et linearibus; sporidiis brunneo-atris, ovato-globosis, breviter pedunculatis, per epidermidis rimam longitudinalem demum effusis.

Habitat in *Ornithogalis* primo vere.

CCXVIII. *Uredo violacea:* pulvere purpureo-violaceo, in antheris prominente. Pers. Syn. Fung. p. 225. U. Antherarum de Cand. Fl. Fr. Suppl. p. 79.

β *Silenes nutantis.*

Donum amicissimi Dr. Wallroth, qui prope Nordhusam fungillum legit,

Obs: Non solum caryophyllearum flores (quod Candollius autumat) aggreditur haec Uredo; in Hyacintho comoso nidulanteum dilectissimus Dr. Kaulfuss Halae observavit.

***CCXIX.** *Uredo segetum:* pulvere copioso nigro in graminum spiculis s. glumis proveniente Pers. l. l. p. 224. U. Carbo de Cand. Fl. Fr. Suppl. p. 76. Ustilago segetum Linck, Ditmar in Sturmii Flora Germanica Sect. III. Fungi Fasc. 3. no. 1.

α *Hordei vulgaris:* Tessier malad. des grains p. 306. f. 2—4.

Prope Tieffurth legimus aestate.

Obs: Flugbrand ab agricolis Germaniae vocatur. Insigne, quod Secale cereale nunquam infestat.

***CCXX.** *Puccinia Ulmariae:* cespitulis hypophyllis, minutis planis, subrotundis, sparsis, epidermide rupta mox effusis et saepe confluenti-

bus; sporidiis obscure badiis, globoso-ovatis, pedunculo brevi-
septulis duobus, altero transverso medio subangulato, altero apicis
perpendiculari. De Cand. Enc. bot. VIII. p. 245. et Fl. Fr. Suppl. p. 56.

Lipsiae autumno legimus in Spiraea Ulmaria.

Obs: Eximia species forma sporidiorum; sed male adhuc descripta.

*CCXXI. *Puccinia Saginae Nobis*: cespitulis amphigenis, epicaulis, epi-
mischis et epanthis, ex rotundo oblongis aut elongatis, pulvinatis,
subsoltariis, demum epidermide omnino liberis, badiis; sporidiis
compactis, cylindricis, uniseptatis, pellucidis: pedunculo elongato
tenui.

In Sagina procumbente prope Delitium, Saxoniae oppidum, ob-
via aestate.

*CCXXII. *Erysibe macropus*: laxiuscule gregaria depresso-globosa,
floccis longis aequalibus septatis discretis, demum erectis. Martius
Fl. crypt. Erlang. p. 392. *)

In foliis Viciae sylvatica in monte Steiger prope Erfordiam au-
tumno lecta.

CCXXIII. *Sepedonium*: Thallus e floccis congestis fungis putrescenti-
bus innatis. Sporidia thallo immixta globosa:

S. mycophilum: Linck Obs: in ord. pl. nat. I. p. 18.

Prope Tieffurth in Agaricis lectum hieme et primo vere.

*CCXXIV. *Helvelia flavovirens*: mitra subrotunda, plano-lacunosa,
basi compressa, flavo-olivacea, stipite compressiusculo, laevi,
ochraceo. Nees ab Esenbeck System p. 175. f. 162. Ueberblick p. 45.
Ehrenberg Sylv. myc. Berolin. p. 19. Leotia lubrica Moug. et Nestl.
Stirp. crypt. Vog.-Rhen. Fasc. VI. no. 583.

Habitat Berolini (Dr. Ehrenberg) et Lipsiae in locis sylvaticis,
siccioribus autumno.

*CCXXV. *Oidium fructigenum*: caespitibus subrotundis, elevatis, floccis
silaceis, sporidiis coloribus. Schmidt myk. Hefte I. p. 80.

In pyris putridis autumnale. Dedit Dr. Ehrenberg, qui egregias
de propagatione et germinatione hujus mucedinis observationes
mox publici juris faciet.

*) Alphitomorpha communis α leguminosarum Wallroth conf. *Verhandlungen d.*
Gesellsch. naturforsch. Freunde in Berlin. I. 1. p. 31.



